

核准日期：2024年11月15日
修改日期：2025年06月09日
修改日期：2025年08月11日
修改日期：2026年07月25日




富马酸喹硫平缓释片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告语

增加痴呆相关精神老年患者的死亡率
患有痴呆相关精神病的老年患者使用抗精神病药物治疗会导致死亡风险增加(参见警告部分)。本品尚未被批准用于患有痴呆相关精神病的老年患者(参见警告部分)。

在儿童、青少年和年轻成人中进行的短期研究中,抗抑郁药可增加自杀想法和自杀行为的风险。这些研究未表明14岁及以下年龄的儿童和青少年的患者其自杀想法和自杀行为风险降低。在65岁及以上患者中,抗抑郁药的使用降低了自杀想法和自杀行为的风险(参见警告部分和注意事项)。
对于开始接受抗抑郁药治疗的所有老年患者,应针对自杀想法和自杀行为的出现和恶化给予密切监测,应告知家属和护理人员,需要密切观察患者,并与医师沟通和交流(参见警告部分和注意事项)。

【药品名称】
通用名称:富马酸喹硫平缓释片
英文名称:Quetiapine Fumarate Extended-release Tablets
汉语拼音:Qieshi ping Fumanate Huanshui pian
【成份】
主要组成成份:富马酸喹硫平。
化学名称:11-[4-[2-(2-乙基噻吩[3,4-*b*]-1-呋喃基)]-2-萘基(b,f)-1,1-二氧杂杂富马酸盐(2:1)
化学结构式:

分子式:(C₂₃H₂₈N₂O₄S)₂·C₄H₂O₄
分子量:688.10
辅料:羟丙甲纤维素、乳糖、枸橼酸、微晶纤维素、硬脂酸镁、聚维酮包衣预聚物(零溶剂)。

【性状】
本品为黄色胶囊状双凸的薄膜衣片,除去包衣后显白色或类白色。

【适应症】
本品用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作。

【用法用量】
200mg(按C₂₃H₂₈N₂O₄S计)

药品应整片吞服,不能掰开、咀嚼或碾碎。与进食与否无关。

成人:
1. 其他抗抑郁药物:本品,本品适用于老年患者。尤其在开始用药时,老年患者应逐渐增加剂量(每日治疗剂量应低于年轻患者)。与年轻患者相比,老年患者的清除平均约需清除降低了30%-50%。老年患者的起始剂量应为50mg/日。根据个体疗效和耐受性,可以将剂量逐日增加50mg,直至有效剂量。

儿童和青少年:
本品在中国未被批准用于治疗18岁以下的患者。

肾功能损害:
肾功能损害患者无需调整用药剂量。本品在肾功能损害患者中应用的临床经验有限。

肝功能损害:
喹硫平在肝中广泛代谢,肝功能损害患者的血药浓度可能会升高,可能需要对剂量进行调整。已知有肝功能损害患者的起始剂量应为50mg/日。根据个体疗效和耐受性,可以将剂量逐日增加50mg,直至有效剂量。

【不良反应】
喹硫平最常见(≥10%)药物不良反应(ADR)为嗜睡、头晕、口干、戒断(停药)症状、血清甘油三酯升高、总胆固醇升高(主要是高密度脂蛋白胆固醇(LDL)升高)升高、高密度脂蛋白胆固醇(HDL)降低、体重增加、血红蛋白降低和轻度体重增加。
以下列出喹硫平最常见不良反应(ADRs)的发生率,该表根据国际医学科学组织委员会(CIOMSII)工作;1995年批准格式制作。

频率	系统损害分类	事件
十分常见(≥10%)	神经系统疾病	口干 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	各类检查	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	各类神经系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
常见(≥1% - <10%)	血液及血液系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	心脏血管疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	眼睛疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	胃肠道系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	各类检查	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	各类神经系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	代谢和营养系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	呼吸系统和胸部疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	血管与淋巴系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	心脏血管疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	胃肠道系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	各类检查	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	生殖系统和乳腺疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
十分罕见(<0.1%)	胃肠道系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	肌肉骨骼及结缔组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
未知	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	全身性损害和给药部位各种反应	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	精神疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	免疫系统疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降 ¹ 体重增加 ¹ 血红蛋白降低 ¹
	皮肤及皮下组织疾病	嗜睡 ¹ 头晕 ¹ 口干 ¹ 戒断(停药)症状 ¹ 血清甘油三酯升高 ¹ 总胆固醇升高(主要是LDL胆固醇) ¹ HDL胆固醇下降